

Неотложная помощь при укусе собаки

Всё произошло почти мгновенно: вы увидели на улице хорошенькую, мохнатую собачку, и рука сама потянулась её погладить, собака расценила ваше действие как угрозу и укусила вас. НА такое даже способен хорошо знакомый пес. Что делать в таких случаях?



Обрабатываем рану



- Если кровотечение не слишком сильное, не пытайтесь сразу же остановить его. С кровью из раны вымывается слюна животного с привнесенными ею бактериями и вирусами, а значит, уменьшается опасность нагноения.
- Промойте место укуса любым дезинфицирующим раствором 3 %-ной перекисью водорода, разведенным в воде мылом (лучше хозяйственным или специальным антибактериальным, в крайнем случае обычным туалетным).
 - Спирт, одеколон и йод не используйте только обожжете обнаженные ткани, и рана будет заживать медленнее.
 - А вот кожу вокруг укуса обработайте 5%-ной спиртовой настойкой йода. От этого она не пострадает, а наоборот, очистится от инфекции. Ведь микроорганизмы, обитающие на кожном покрове, тоже способны вызвать нагноение, попав в ранку.
- Теперь покройте рану специальным бактерицидным пластырем. Или наложите стерильную повязку и бегом в ближайшее медицинское учреждение травм-пункт, поликлинику, больницу.

- Сделать это нужно в любом случае. Даже если собака не бродячая и привита от всех возможных болезней, все равно рану должен осмотреть и обработать врач.
 Разорванные зубами ткани сильно травмируются и, как мы уже говорили, обильно инфицируются микробами.
 - Если над укусом не поработал специалист, он будет заживать долго, возможно, грубые рубцы останутся на всю жизнь. А когда ребенок пострадал от незнакомого животного и, значит, есть риск заражения бешенством, в рану и окружающие ее ткани доктор введет специальную сыворотку или антирабический иммуноглобулин.



Степень риска.



Укусы лица, головы, шеи, пальцев рук опасны не только изза косметического дефекта. Если собака больна, вирус бешенства, как по канатам, карабкается по нервным стволам в головной мозг. Инфекция может достичь цели уже к десятому дню, вызвать бурное развитие болезни.

Тогда как при укусах тела, нижних конечностей инкубационный период растягивается на срок от 1 до 3 месяцев.

Когда на вас набросился бродячий пес явно «не в себе», агитировать за прививку против бешенства "это 5-6 уколов!" не приходится. А если сын или дочь пострадали от соседской собаки, вполне здоровой на вид? Имейте в виду: выглядеть больным животному необязательно. Оно становится заразным за 8-10 дней до появления первых признаков бешенства. То есть по сути дела, в конце инкубационного периода постепенно развивающейся болезни.



В идеале домашнюю собаку полагается изолировать на 10-дневный срок после укуса. Если за это время у нее не появятся тревожные симптомы - беспокойство, злобность, нарушение походки, слюнотечение, водобоязнь, - пес здоров. В том случае, когда устроить карантин невозможно, необходимо настоять, чтобы хозяева обязательно отвел! животное на консультацию к ветеринару.

Другой серьезный вопрос, - привиты ли вы от столбняка? Чтобы ответить на него, врач должен заглянуть в индивидуальный календарь прививок. Обязательно возьмите в медицинское учреждение детскую амбулаторную карту - в ней записаны эти важные сведения.

Если вас вакцинировали от столбняка год назад или меньше? Тогда новой прививки не потребуется. Прошел большой срок? Лучше не рисковать здоровьем и потерпеть еще один укол.

Медицинская сестра Лыкова М. Н.